

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Quartz ES (1070-2), Legacy 500 SC (396-26), Sempra SC (1046-5) og Diflanil 500 SC (601-1) mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da HortiAdvice A/S udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan HortiAdvice A/S ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår effektivitet og fytotoksicitet.

Vejledning og brugsanvisning til mindre anvendelse af Quartz ES (1070-2), Legacy 500 SC (396-26), Sempra SC (1046-5) og Diflanil 500 SC (601-1) mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben

Advarsel:

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges.

Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Virkemåde:

Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages gennem kimstænglen ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.

Optimale virkningsforhold:

Fugtig jord.

På humusjorde kan der være nedsat effekt.

Brugsanvisning

Anvendelsesområde:

Quartz ES (1070-2), Legacy 500 SC (396-26), Sempra SC (1046-5) og Diflanil 500 SC (601-1) anvendes i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben til bekæmpelse af ukrudt.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Der må maksimalt sprøjtes en gang med et diflufenicanholdigt middel pr. år.

Der skal anvendes afskærmet sprøjtning.

Må ved doseringer op til 0,15 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må ved doseringer op til 0,25 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Etableringsårene

Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC må anvendes 1 gang om foråret før knopbrydning eller 1 gang om efteråret efter høst.

Ved forårsanvendelse må der ikke høstes/anvendes bær fra buskene (8 måneders sprøjtefrist).

Høstårene

Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC må anvendes 1 gang om efteråret efter høst og ikke senere end 8 måneder før høst.

Dosering:

Der må maksimalt anvendes 0,25 l middel/ha pr. vækstår.

Oktober 2013 Opdateret 6. september 2024