

# LEGACY® 500 SC

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

**Analyse:**  
Diflufenican 500 g/L (42% w/w)  
**Formulering:**  
Midlet er en suspensionskoncentrat (SC)  
**Ukrudtsmiddel nr.:** 396-26  
**Virkemåde:** HRAC F1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Fabrikationsnummer og produktionsdato:** se emballagen  
**Holdbarhed:** Minimum 2 år fra produktionsdatoen

**Godkendelsesindehaver:**  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden  
Holland  
www.adama.com

© ADAMA Irvita N.V.

1 L e



Etiket nr: **GODKENDT**

1. november 2016

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

1L &  
12x1L

Scan for brug



## LEGACY® 500 SC



## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*  
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales og ikke senere end vækststadium 28.  
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandærbrugsanvisning.

**Indånding:** Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

**Indtagelse:** Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

**Hudkontakt:** Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



8 718077 001357

UN 3082



DENMARK

ANELGYDKIL1/02/A  
T3491A/05

# LEGACY® 500 SC



åbnes her



## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales og ikke senere end vækststadium 28.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt


Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

**Indånding:** Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

**Indtagelse:** Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

**Hudkontakt:** Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



UN 3082



DENMARK

ANELGYDKILT/02/A  
T3491A/05

**Virkemåde**

Aktivstoffet i Legacy® 500 SC (diflufenican) optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra nyfremspirende ukrudt optager diflufenican, herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.

Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

**AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT****Afgrøder**

Legacy® 500 SC kan anvendes i vintersæd, vårbyg og vårhvede.

**Anvendelsesområder og dosering.**

Afgrøde	Udviklingsstadiet	Max dosering
<b>Efterårsanvendelse</b>		
Vinterhvede, vinterbyg, rug og tritcale.	00 - 28	0,15 L/ha
<b>Forårsanvendelse</b>		
Vinterhvede, vinterbyg, rug og tritcale.	20 - 28	0,24 L/ha
Vårbyg og vårhvede	00 - 19	0,1 L/ha
	20 - 28	0,15 L/ha

Legacy® 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt.

Legacy® 500 SC er ikke farlig for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid.

**Anvendelsesområde og virkningsoversigt**

Legacy® 500 SC er særdeles effektiv overfor en lang række ukrudtsarter, se tabellerne nedenfor.

## Vintersæd:

Ukrudsart	Udviklingstrin		
	0-2 løvblade	3-4 løvblade	4-6 løvblade
Agerstedmoder	0,06 L/ha	0,12 L/ha	0,12 L/ha
Markforglemmigej			
Hyrdetaske		0,24 L/ha	0,24 L/ha
Fuglegræs			*
Ærenpris	0,12 L/ha		0,24 L/ha
Tvetand			
Ferskenpileurt			
Vejpileurt			
Kamille	*	*	
Burresnerre	*	*	*

\*Med 0,24 L/ha Legacy® 500 SC opnås en hæmning af de pågældende ukrudsarters vækst.

## Vårbyg og vårhvede:

Ukrudsart	Udviklingstrin	
	0-2 blade	3- blade
Agerstedmoder	0,06 L/ha	0,15 L/ha
Markforglemmigej		
Hyrdetaske		
Fuglegræs		
Ærenpris	0,15 L/ha	**
Tvetand		
Ferskenpileurt		
Vejpileurt	**	
Burresnerre		
Kamille		

\*\*Med 0,15 L/ha Legacy® 500 SC opnås en hæmning af de pågældende ukrudsarters vækst

Hvis Enårig Rapgræs skal hæmmes, anbefales den højeste dosering af Legacy® 500 SC.

## Dosering

### Vintersæd

Legacy® 500 SC udsprøjtes med 0,06-0,24 l/ha afhængigt af ukrudtets udviklingsstadium og sammensætning. For at opnå en bredere ukrudtseffekt kan der tankblandes med Nicanor 20 SG mod tokimbladet ukrudt eller med Lexus mod græsukrudt.

### Vårsæd

0,06-0,15 l/ha på ukrudtets kimbladsstadium i blanding med Nicanor 20 SG. Ved forekomst af burresnerre tilsættes Tomahawk. Ved de højeste doseringer og gode fugtighedsforhold opnås en kraftig hæmning af enårig rapgræs med op til 3 blade.

## RESISTENSSTRATEGI

### Resistens

Produkt Legacy® 500 SC tilhører gruppen af Pyridinecarboxamides (HRAC gruppe F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke fundet tilfælde med resistens.

### Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

### Produktmæssige begrænsninger

I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter på afgrøden, pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet. Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Legacy® 500 SC om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning.

Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Legacy® 500 SC behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.

### Tilberedning af sprøjtevæsken

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at

overlapping i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s). Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikanter på markedet, der opfylder gældende regler. Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyser, men har en mindre andel af små dråber.

## SPRØYTETEKNIK

Legacy® 500 SC udsprøjtes med 150-200 L vand pr. ha. Det anbefales at anvende f.eks. Hardi's ISO F02 dyse med et tryk på 3 bar (eller tilsvarende low drift dyse).

### Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægnings. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

## TANKBLANDINGER

Legacy® 500 SC kan tankblandes med Ally, Boxer, Briotril 25 SC, Lexus, mini-midler, Nicanor 20 SG, Oxitril, Primera Super, Stomp, Tomahawk og Trimmer 50 SG.

### Klima

Legacy® 500 SC kan bruges helt ned til 2 grader celsius, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til frost bør sprøjtning først udføres, når planterne igen er saftspændte.

## **Jordtype & jordfugt**

På humusjord kan der være nedsat effekt af Legacy® 500 SC. God jordfugtighed.

### **TOM EMBALLAGE**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genbruges.

### **LAGERING/OPBEVARING**

Opbevares utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer. Skal opbevares frostfrit.

### **PRODUKTANSVAR**

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

#### **Varemærke registrere af:**

Legacy® - ADAMA Irvita N.V.

Nicanor® - ADAMA Registrations B.V.

Trimmer®, Tomahawk® - ADAMA Agan Ltd.

Stomp® - BASF;

Oxitril CM®, Primera® - Bayer CropScience;

Ally®, Lexus® - DuPont;

Boxer® - Syngenta Limited.

# LEGACY<sup>®</sup> 500 SC

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### Analyse:

Diffufenican 500 g/L (42% w/w)

### Formulering:

Midlet er en suspensionskoncentrat (SC)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-26

Virkemåde: HRAC F1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

### Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

\* ADAMA Irvita N.V.



ADAMA

12 x 1 L

ANELGYDKILT/02/C1  
T3491D/05

LEGACY<sup>®</sup> 500 SC



# LEGACY® 500 SC

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



**Analyse:**  
Diflufenican 500 g/L (42% w/w)  
**Formulering:**  
Midlet er en suspensionskoncentrat (SC)  
**Ukrudtsmiddel nr.:** 396-26  
**Virkemåde:** HRAC F1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Fabrikationsnummer og produktionsdato:** se emballagen  
**Holdbarhed:** Minimum 2 år fra produktionsdatoen

**Godkendelsesindehaver:**  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden  
Holland  
[www.adama.com](http://www.adama.com)

\* ADAMA Irvita N.V.

# 12 x 1 L

Scan for brug



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales og ikke senere end vækststadium 28.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.


Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### FØRSTEHJÆLP

#### Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

**Indånding:** Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

**Indtagelse:** Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

**Hudkontakt:** Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



UN 3082



ANELGYDKIL.T/02/C2  
T3491D/05