

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Fibro EC (631-11) mod spindemider, bladlus, mellus, tæger, cikader og trips i agurk, tomat, aubergine, peberfrugt, chili, melon og friske bønner i åbne og lukkede væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Fibro EC (631-11) mod spindemider, bladlus, mellus, tæger, cikader og trips i agurk, tomat, aubergine, peberfrugt, chili, melon og friske bønner i åbne og lukkede væksthuse

### Insekt- og midemiddel:

- Må kun anvendes mod spindemider, bladlus, mellus, tæger, cikader og trips i agurk, tomat, aubergine, peberfrugt, chili, melon og friske bønner i åbne og lukkede væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- 

### Advarsel:

"Se Fibro EC etiketten"

## Brugsanvisning

Til anvendelse mod spindemider, bladlus, mellus, tæger, cikader og trips i åbne og lukkede væksthuse

| Afgrøde  | Dosering pr. behandling                              | Vandmængde      | Antal behandlinger (interval) | Behandlings-tidspunkt (vækststadier)          | Sprøjtefrist/ PHI |
|--|--|-----------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Agurk, tomat, aubergine, peberfrugt, chili, melon og friske bønner | Max 10 L/ha<br><br>Udsprøjtet i en max 2 % opløsning | 300 - 2000 L/ha | 2 pr. hold* (min. 7 dage)     | BBCH 10-89 (først udviklet blad – efter høst) | Ikke relevant     |

\*Der sættes ikke restriktion på max antal hold pr. areal pr. år

### Sprøjteudstyr:

Sprøjte med lodret bom, med eller uden luftassistance.

Kærresprøjte med lanse. Hånd- eller rygsprøjte.

### Risiko for skade:

Sprøjt ikke i stærkt sollys og/eller ved høje temperaturer, eller når tørring tager lang tid, f.eks. sent på dagen. Disse forhold kan forårsage skade på bladene.

HortiAdvice anbefaler at holde mindst 7 dages afstand til svampesprøjtninger.

Fibro EC kan have en negativ effekt på nyttedyr, hvilket bør tages i betragtning ved brug:

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Dato: 23. juni 2025