




Etikette nr.:
GODKENDT II

13 JULI 2011

for pakninger på
Miljøstyrelsen

10kg

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd,
ærter og kartofler



UKRUDTSMIDDEL

Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-36

Analyse : Pendimethalin 400 g/kg (40%)
Vand dispergerbar granulat

Vægt : Nettoindhold 10 kg

Godkendelsesinnehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL 3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovplichtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, ærter og kartofler.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst.

Må i vinter- og vårsæd og kartofler ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, saer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må i ærter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, saer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurense vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp

Indånding

Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern forurenede klæder. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Øjenkontakt

Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Indtagelse

Giv vand at drikke. Søg omgående lægehjælp.



8718077002927



DENMARK




Lokalmitterende



Miljøfarlig

MABADK/A/02



Activus® 40 WG BRUGSANVISNING

Virkemåde

Activus 40 WG er et bredspektrum ukrudtsmiddel med virkning mod enårlige græsser samt tokimbladet frøukrudt i korn, ærter og kartofler. Activus optages af ukrudtets blade og rødder og kan derfor anvendes før eller efter fremspring.

Afgræder

I vintersæd (hvede, rug, triticale og byg) og ærter anvendes Activus 40 WG enten før eller efter fremspring. I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspring. Kartofler behandles før fremspring.

Dosering og blandinger . Der må højest anvendes én maksimal dosering pr. afgræde.

Anvendelse	Udviklingsstadi	Dosering
Vintersæd efterår: Hyrdetaske, tvetand, valmue, fuglegræs og ærenpris	Stadie 00-13	1,25 kg/ha
Vårbyg og vårhvede: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie 10-13	1,0 kg/ha
Vårbyg/hvede med udlæg af kløver: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie 10-13	1,0 kg/ha
Markært: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie <9 Afræde 3-5 cm Afræde 2-3 cm + 7-10 dage senere Stadie 00-08	1,875 kg/ha 1,5 kg/ha 0,75 kg/ha 0,75 kg/ha
Kartofler: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.		1,25 l/ha

I vintersæd før fremspring anvendes Activus fra 0-5 dage efter såning, på fugtig jord evt. efter tromling. Efter fremspring anvendes Activus bedst, når kornet har 1-2 blade og ukrudtet står på kimbladstadiet. Før fremspring anvendes 0,5-1,25 kg/ha mod bredbladet ukrudt. Activus 40 WG kan i efteråret blandes med f.eks. Lexus, Boxer, Briotril 400 EC samt Primera Super

I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspring, når det tokimbladede ukrudt har udviklet 2 løvblade. Normalt anvendes Activus 40 WG i tankblanding med f.eks. Briotil 400 EC eller Express ST.

I vårsæd med udlæg af græs eller kløvergræs anvendes en kombination af Activus 40 WG + Basagran M75 eller Fighter 480. Behandling-en udføres på ukrudt med max. 2 løvblade. Kløveren skal på behandlingstidspunktet have udviklet spadeblad. Sådybden skal sikre at der ikke opstår direkte kontakt mellem fræne og sprøjtevæsken. Morgen behandling foretrækkes da der helst skal være en høj luftfugtighed og dagtemperatur bør komme over 12°C, samtidig med at nattemperaturen ikke bør komme under 5°C. Behandlingen udføres med 0,25-1,0 kg/ha Activus 40 WG + 1,5 l/ha Basagran M75 eller 1,0 l/ha Fighter 480 + olie.

Ærter behandles før eller efter fremspring med Activus 40 WG. Ved behandling før fremspring anvendes der 0,5-1,875 kg/ha.

Behandling efter fremspring anvendes Activus 40 WG i tankblanding med Fighter 480 eller Basagran M75 i en delt behandling. Første behandling udføres på 2-3 cm høje ærter og gentages når de er 4-6 cm høje. Doseringen af Activus 40 WG er i begge behandlinger 0,75 kg/ha + 0,4-0,5 l/ha Fighter 480 eller 0,75 l/ha Basagran M75/ha.

Kartofler behandles med 0,5-1,25 kg Activus/ha før fremspring. Behandlingen udføres, når kartoflerne er færdighyppede og kammene har sat sig. Kammen bør af hensyn til effekten være fugtig på behandlingstidspunktet for at sikre den bedste virkning. Hermed sikres en god effekt på en lang række tokimbladet ukrudt. For at sikre effekten mod f.eks. kamille, hvidmelet gåsefod og pileurt er det anbefales at tankblande med Fenix. Virkning på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstofet bindes til det organiske materiale. Større mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Sprøjte teknik

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Activus 40 WG er ikke farlig for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortynes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortynes 50 gange med vand og udspøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtrer, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

HUSK, at skylevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Resistens:

Pendimethalin er ifølge HRAC (ukrudts resistens komiteen) karakteriseret som tilhørende resistens gruppe K1. Risikoen for forekomst af resistente ukrudts arter er ifølge Det Jordbruksvidenskabelige Fakultet vurderet som lav ved anvendelse af Activus, dog bør tankblandinger med produkter med anden virkemekanisme eller skift mellem midler altid tages i betragtning for at mindske risikoen for resistens.

Blandinger

Activus 40 WG kan tankblandes med Briotril® 400 EC, Lexus®, Boxer®, Legacy®, Primera Super®, Fenix®, Fighter® 480, Basagran M75 og Glyphosat.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Beholderen fyldes halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Activus. Hold omrøreren i gang og tilsæt evt. blandingspartneren. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang. Activus skal tilsættes langsomt under omrøring så granulatet op løser sig når det kommer i vand.

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsorden for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skyldes inden bortskaffelse. Skylevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Produktansvar

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger: Mange faktorer, såsom vejforhold, jordtype, sortresistens, sprøjtekunst og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og ligende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres Leverandør.

Activus® er et registreret varemærke
Feinchemie Schwebda GmbH

Registrerede varemærker:

Activus® - Feinchemie Schwebda GmbH
Briotril® - Agan Chemical Manufacturers
Lexus® - E.I. du Pont de Nemours & Company
Boxer® - Syngenta
Primera® Super, Fenix® - Bayer CropScience AG
Fighter®, Basagran® - BASF Aktiengesellschaft

ACTIVUS® 10 kg

ACTIVUS® 10 kg



ACTIVUS® 10 kg

Activus® 40 WG BRUGSAMVISNING

Virkemidde

Activus 40 WG er et bredspektrum ukrudtsmidde med virkning mod enlige græsser samt tolmbladet frukrudit i korn, ærter og kartofler. Activus optages af ukruæts blade og rødder og kan derfor anvendes for ølærstær fremspring.

Algredse

I vintersæd (hvete, rug, træcole og byg) og ærter anvendes Activus 40 WG enten før eller efter fremspring. I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspring. Kartofler behandles før fremspring.

Dosering og blanding

Der må højst anvendes 10 kg hektar dosering pr. afgrøde.

Anvendelse	Udbringningsdato	Dosering
Vintersæd (hvete)	Stædt 0-13	1,25 kg/ha
Hvættesæd, ristæd, vamse, hulgren og ærter	Stædt 0-13	1,0 kg/ha
Hvedemel gisæd, ristæd, ærter og stedmøder	Stædt 0-13	1,0 kg/ha
Vårlægning med ulige af klyper	Stædt 0-13	1,0 kg/ha
Hvedemel gisæd, metand, ærter og stedmøder	Stædt 0-13	0,75 kg/ha
Makrurt	Græs: c3 Algredse: 2,5 cm Hvedemel gisæd, ristæd, ærter og stedmøder	1,0 kg/ha
Hvedemel gisæd, ristæd, ærter og stedmøder	7-10 dage senere	0,75 kg/ha
Kartofler	1,25 kg/ha	

I vintersæd før fremspring anvendes Activus 40 WG 0,5 dage efter sårning, på fugtig jord evt. efter bremning. Efter fremspring anvendes Activus bedst, når kartofler har 1-2 blade og ukruæts står på bimådestadiet. For fremspring anvendes 0,5-1,25 kg/ha mod bredbladet ukruæt. Activus 40 WG kan i øjeblikket blandes med f.eks. Lexus, Boxer, Bronto 40 EC samt Primera Super.

I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspring, når det tolmbladede ukruæt har udviklet 2 levblade. Normalt anvendes Activus 40 WG i tankblanding med f.eks. Bronto 40 EC eller Express ST.

I vårsæd med udtag af græs eller hulgren kan anvendes en kombination af Activus 40 WG + Basagran M75 eller Fighter 400. Behandling af udtaget græs kan ske ved at udtaget behandles med aktivt spand. Sådanne udtag skal altid være såd at de ikke opstår direkte kontakt mellem græs og sprøjtevasken. Mørge behandling forstørres så de højt skal være en halvtogtpunkt og dags temperaturer ikke bør komme under 5°C. Behandlingen udføres med 0,25-1,0 kg/ha Activus 40 WG + 1,5 l/ha Basagran M75 eller 1,0 l/ha Fighter 400 + o.l.

Efter behandling før eller efter fremspring med Activus 40 WG. Ved behandling før fremspring anvendes 0,5-1,25 kg/ha. Behandling efter fremspring anvendes 0,25-1,0 kg/ha. Bronto 40 EC kan behandles sammen med Activus 40 WG i tankblanding med fighter 400 eller Basagran M75. Det behandles med 2,3 cm højde og behandlingsdosen må ikke være over 0,4-0,5 kg/ha. Doseringen af Activus 40 WG er i begge behandlinger 0,75 kg/ha + 0,4-0,5 l/ha Fighter 400 eller 0,75 l/ha Basagran M75.

Kartofler behandles med 0,5-1,25 kg Activus før fremspring. Behandlingen udføres, når kartoflerne er tærligvoksende og kampane har sat sig. Kampane bør af hensyn til effekten være fængt på behandlingspunktet for at sikre den bedste virkning. Herved sikres en god effekt på en lang række tolmbladet ukruæt. For at sikre effekten mod taks, kamfe, hvidmekel gisæd og piseruter kan det behandles med Fanz. Virkning på hvidmekelig korn kan vedvaret ved at ølvestof, der bindes til det organiske materialet, skal blive tilført og deraf følgende vens fordeling til produktet og deraf følgende vens virkning.

Activus® er et registreret varerigtte fra Fainchemie Schwenda GmbH.

Registrerede varerigtter:
Activus®, Fainchemie Schwenda GmbH
Bronto®, Agro Chemical Manufacturers
Lexus®, E.I. du Pont de Nemours & Company
Boxer®, Syngenta
Primera®, Bayer CropScience AG
Fighter®, BASF Aktiengesellschaft