

BOOM EFEKT

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse: Glyphosat 360 g/l (30.35% w/w)
(svarende til glyphosat-isopropylammonium 485,84 g/l
(40.96% w/w)) ved 20°C.

Etiket nr.: II

GODKENDT

af Miljøstyrelsen:

13. december 2023

For pakninger på:

5L, 4x5L, 20L, 200L, 640L
& 1000L

Fraengetaka Gro-ol



TK10K_Boom Efekt_SL_F_241123

Ukrudtsmiddel nr. 756-6

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Indhold: **5L**

Godkendelsesindehaver: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenien

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

 **ALBAUGH®**
your alternative

Anvendelsesområde	Behandling/ skadegører	Dosering (l/ha)	Antal doseringer (interval)	Tidspunkt	Behandlings- frist
Bærbuske (under buske og mellem rækker) (traktormonteret eller håndholdt)	Et-årige og flerårige græsser og bredbladet ukrudt	1.5-8.0 Max total dosis ved 1 behandling: 8.0 Max total dosis ved 2 behandlinger: 10.0 Max total dosis ved 3 behandlinger: 10.0	1-3 (28 dage)	Når ukrudtet er i god vækst (10-30 cm). Kulturen og rodstud må ikke rammes.	30 dage

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken startes.

Præparatfyldedustyr: Ved anvendelse af præparatfyldedustyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efter fyldning skylles præparatfyldedustyret, samt evt. tomme dunke for at fjerne pesticidrester. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Boom effekt i fyldestationen.

Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger

Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding: Anvend beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredbom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllvandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengørings-processer.

- Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyll vandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal.

- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyll vandstanken. Skyll vandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.

- Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter rengøringsmiddel (eks. None-ionisk spredt/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyll vandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRAC gruppe	Risiko for udvikling af resistens
Boom effekt	Herbicid	Glyphosat	9/G	Lav

Albaugh TK d.o.o. anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh TKI d.o.o., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Lagring

Opbevares tørt og frost frit.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Denne sektion er ikke en del af produktetiketten under Plantebeskyttelsesmiddelforordningen (EC) 1107/2009. Sektionen giver yderligere råd om produktbrug efter ansøgerens skøn.

Vilkår og betingelser for levering, salg og brug

Mange faktorer kan påvirke dette produkts aktivitet, herunder, men ikke begrænset til: vejr- og jordforhold, afgrødesort, behandlingstidspunkt, vandmængde, doseringsmængder, sprøjteknikker, afgrøderotation, regionale faktorer og forekomst og udvikling af stammer, der er resistente over for den aktive ingrediens. Under visse omstændigheder kan der forekomme ændringer i aktivitet eller beskadigelse af afgrøder. Producenten eller leverandøren kan ikke acceptere noget ansvar under disse omstændigheder. Alle varer, der leveres af os, er af høj kvalitet, og vi mener, at de er egnede til det formål, vi udtrykkeligt leverer dem til: Da vi ikke kan udøve nogen kontrol over blanding, anvendelse eller påføring af produktet, som kan påvirke produktets ydeevne, vil alle betingelser og garantier angivet lovgivningsmæssigt eller på anden måde vedrørende kvaliteten eller egnetheden til ethvert formål med vores produkter være udelukket, og vi påtager os intet ansvar for nogen som helst skade eller personskade som følge af deres opbevaring, håndtering, anvendelse eller brug. Disse betingelser kan ikke ændres af vores personale, vores agenter eller distributører af produktet, uanset om de fører tilsyn med eller hjælper med brugen af sådanne produkter.



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning jf. brugsanvisningen.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af græsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Nedvisning i sennepsra. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, korsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, tritcale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra \$3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,77 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra \$3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,77 L produkt/ha op til og inklusiv 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra \$3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, fjern kontamineret tøj og vask straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Ukrudtsmiddel nr. 756-6

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat 360 g/l (30.35% w/w) (svarende til glyphosat-isopropylammonium 485,84 g/l (40.96% w/w) ved 20°C.

Godkendelsesindehaver:
Albaugh TKI d.o.o., 1 Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenien

* TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



TKI_EK_Boom Efekt_LB_L_24.11.23

Brugsanvisning

Boom effekt anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring.
- Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugtræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
- Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.
- Omlægning af græsmarker.
- Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer.
- Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.
- Nedvisning i sennepsfrø indtil 10 dage før høst.

Virkemåde

Boom effekt virker ved at hindre dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket slår planten ihjel. Boom effekt indeholder 360 g/l glyphosat i form af 480 g/l glyphosat-isopropylaminsalt. Boom effekt optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm ud i hele planten inklusiv rodsystemet. Efter ca. 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Klimaforhold ved anvendelse

Optimal effekt opnås ved behandling på tørre aktivt voksende planter, ved høj luftfugtighed og gode temperaturforhold samt gode fugtighedsforhold i jorden.

Under andre forhold kan det forventes, at produktet virker ringere eller effekten er langsommere.

Regnfasthed

Boom effekt er regnfast efter 6 timer.

Jordtyper

Boom effekt kan anvendes på alle jordtyper.

Sprøjteteknik og vandmængde

Boom effekt skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Den bedste effekt opnås med lavest mulige vandmængde. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets art, størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed km/t
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)	2,5	5,5

Doserings- og anvendelsesvejledning

Laveste dosering anvendes under gode vækstforhold samt lave ukrudtsmængder. Efter ca. 10 dage kan jorden bearbejdes og tilplantes.

Anvend ikke mere end 3.6 kg / ha glyphosatsyre aktiv ingrediens (svarende til 10 liter / ha 360 g / liter produkt) i alt på et hvilket som helst areal i et hvilket som helst kalenderår.

Anvendelsesområde	Behandling/ skadegører	Dosering (l/ha)	Antal doseringer (interval)	Tidspunkt	Behandlings- frist
Udyrkede arealer <i>(Eksempelvis industriområder) såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Dog ikke på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. (traktormonteret eller håndholdt)</i>	Uønsket plantevækst	1.5-6.0 Max total dosis ved 1 behandling: 6.0 Max total dosis ved 2 behandlinger: 10.0 Max total dosis ved 3 behandlinger: 10.0	1-3 (28 dage)	Hele vækstsæsonen.	-
Sennep	Nedvisning	2.0-3.0	1	Typisk når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Ca. 2-4 dage før skårlægningstidspunkt, eller 14-21 dage før direkte høst. Må ikke anvendes i afgrøder til frø. For høst må Boom effekt kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved plet-sprøjtning forstås behandling med Boom effekt på mindre områder af marken.	10 dage
Stubmarker (traktormonteret eller håndholdt)	Spildkorn, et-årige og flerårige græsser og bredbladet ukrudt, kvik	1.0-6.0	1	For at sikre god genvækst, bør halmen fjernes efter høst. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: efterår og forår senest 5 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: efterår og forår senest 2 dage før direkte såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 10 dage før jordbearbejdning.	-
Omlægning af græsmarker (traktormonteret eller håndholdt)	Nedvisning	1.0-6.0	1	Når græs og kvik har 3-6 blade. For høst efterår og forår senest 10 dage før høst eller såning. Boom effekt må kun anvendes i foderafgrøder som pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Boom effekt på mindre områder af marken.	-

Anvendelsesområde	Behandling/ skadegører	Dosering (l/ha)	Antal doseringer (interval)	Tidspunkt	Behandlings- frist
Efter såning før fremspiring	Ukrudt og uønsket vegetation.	1.0-4.0	1	For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Højeste dosis: senest 5 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde. Laveste dosis: senest 2 dage før såning eller plantning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning.	-
Før såning	Ukrudt, før jordbearbejdning BBCH 00	1.0-4.0	1	Der kan behandles mod kvik og andet ukrudt før jordbearbejdning. Kvikken skal have 3-6 blade. Kan tilsås eller beplantes, når ukrudtet begynder at blive brunt. Behandling i foråret har ikke nær så god effekt på kvik, som behandling i efteråret.	-
Skovbrug (traktormonteret eller håndholdt)	Græs- og bredbladet ukrudt	2.0-8.0 Max total dosis ved 1 behandling: 8.0 Max total dosis ved 2 behandlinger: 10.0 Max total dosis ved 3 behandlinger: 10.0	1-3 (28 dage)	Behandling udføres normalt efter plantning på et passende tidspunkt for effekt. Når ukrudtet er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift.	-
Frugtplantager (under træer og mellem rækker) (traktormonteret eller håndholdt)	Et-årige og flerårige græsser og bredbladet ukrudt	1.5-6.0 Max total dosis ved 1 behandling: 6.0 Max total dosis ved 2 behandlinger: 9.0 Max total dosis ved 3 behandlinger: 10.0	1-3 (28 dage)	Efter høst men før museøre stadiet. Når ukrudtet er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift.	30 dage



BOOM EFEKT

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af græsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Nedvisning i sennepsrø. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Frugter og bær fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr.

Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,77 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,77 L produkt/ha op til og inklusiv 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, fjern kontamineret tøj og vask straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.



Ukrudtsmiddel nr. 756-6

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat 360 g/l (30.35% w/w) (svarende til glyphosat-isopropylammonium 485,84 g/l (40.96% w/w)) ved 20°C.

Godkendelsesindehaver:

Albaugh TKI d.o.o., 1 Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenien

* TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

ALBAUGH[®]
your alternative



BOOM EFEKT

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning jf. brugsanvisningen.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af græsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Nedvisning i sennepsfrø. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Frugter og bær fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr.

Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,77 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,77 L produkt/ha op til og inklusiv 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,44 L produkt/ha (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, fjern kontamineret tøj og vask straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Ukrudtsmiddel nr. 756-6

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat 360 g/l (30.35% w/w) (svarende til glyphosat-isopropylammonium 485,84 g/l (40.96% w/w)) ved 20°C.

Godkendelsesindehaver:

Albaugh TKI d.o.o., 1 Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenien

® trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



Indhold:
4x5L

ALBAUGH®
your alternative